
Les mer om ...

I DETTE NUMMERET

Schizofreni – en folkesykdom

Schizofreni rammer mer enn 400 nordmenn hvert år, og om lag 10 % av alle uføretrygdede har schizofreni. Sykdommen er forbundet med stor menneskelig smerte for både pasienter og pårørende. Likevel står ikke forskningsinnsatsen i forhold til sykdommens betydning, og behandlingen er ikke alltid tilfredsstillende.

Tidsskriftet starter i dette nummer en artikkelserie om schizofreni for å gi norske leger oppdatert kunnskap om denne folkesykdommen.

Schizofreni – gåte ved gåte

Schizofreni – omfang og betydning

Tidlig påvisning av schizofreni – er primærprofylakse mulig?

Nevrokognitive forstyrrelser ved schizofreni

Psykiatriske kontroverser

Det første terapeutiske samfunn i norsk psykiatri ble i sin tid etablert under stor motstand. Fortsatt baserer psykiatrisk behandling seg på flere ulike forståelsesmodeller. Ringen & Dahl argumenterer for at nevrobiologi må danne grunnlaget for alle psykiatriske forståelsesmodeller. Karterud & Wilberg redegjør for nye amerikanske retningslinjer for behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse.

Grunnleggeren av det første terapeutiske samfunn i norsk psykiatri

Modeller og trender i psykiatri – bør nevrobiologi danne en felles basis?

Amerikanske retningslinjer for behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse

Strid om ledelse

Legers og Legeforeningens synspunkter om ledelse av sykehusavdelinger skaper storm.

Legekunst og ledekunst

Ledelsesdebatt med mange fasetter


– Legeforeningen har gått i vannet

Riktig leder til riktig oppgave må telle mest

Ikke-leger som ledere er ikke-sak i Vest-Agder

Personkjemi og samarbeidsklima avgjørende

Hepatitt



Hepatitt B- og C-virus er hyppige årsaker til leversykdom. Hos 236 pasienter med hepatitt C i Nord-Norge var gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut 23 år, og stoffmisbruk var smittemåte hos to av tre pasienter. En studie fra Sør-Trøndelag viste at

fire av 83 barn født av mødre med hepatitt C ble smittet. Fra Ullevål universitetssykehus publiseres anbefalinger vedrørende hepatitt B og hepatitt C hos barn.

Hepatitt C i Nord-Norge – et åtteårsmateriale

Vertikal overføring av hepatitt C-virus i Sør-Trøndelag

Hepatitt B hos barn – diagnostikk, oppfølging og behandling

Hepatitt C hos barn – diagnostikk, oppfølging og behandling

Hyppigere og bedre svangerskapskontroll?



1 780 fødende kvinner ved 54 fødeavdelinger

i desember 2000 hadde i gjennomsnitt vært til kontroll hos lege eller jordmor 12 ganger under svangerskapet, like hyppig som i 1996, men hyppigere enn anbefalt i retningslinjene fra 1984.

Erfaringer fra Otta tyder på at ultralydundersøkelse av gravide kan gjennomføres av allmennlege på en trygg og god måte.

Svangerskapsomsorgen i Norge – mange unødvendige kontroller

Ultralydundersøkelse i primærhelsetjenesten – erfaringer innen obstetikk 1983 – 99

Publisert: 30. august 2002. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 21. juli 2026.