

---

## H.V. Holm og medarbeidere svarer:

---

### KOMMENTAR

HENRIETTE VEIBY HOLM

holm.henriette@gmail.com

Henriette Veiby Holm er lege i spesialisering i kirurgi og urologi ved Bærum sykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

ALV A. DAHL

Alv A. Dahl er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

OLBJØRN HARALD KLEPP

Olbjørn Harald Klepp er professor emeritus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

SOPHIE D. FOSSÅ

Sophie D. Fosså er professor emerita ved Universitetet i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

---

Vi takker Berg & Tandstad for kommentaren. De har viktige innspill som vi er helt enige i. Vi anbefaler i artikkelen at pasienter med nydiagnostisert metastatisk prostatakreft henvises tidlig til onkolog for vurdering av induksjonsbehandling med docetaxel. Når det nylig er vist at også abiraterone har en signifikant tilleggseffekt allerede i kastrasjonsfølsom fase (1), er det ytterligere grunn til å få tidlig vurdering av onkolog. Videre mener vi at oppfølgingen av utvalgte pasienter under kastrasjonsbehandling kan skje i samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, hvor pasientene henvises raskt tilbake til spesialist ved tegn til progresjon, som for eksempel PSA-stigning.

---

## LITTERATUR

1. James ND, De Bono JS, Spears MR et al. Adding abiraterone for men with high-risk prostate cancer (PCa) starting long-term androgen deprivation therapy (ADT): Survival results from STAMPEDE (NCT00268476). *J Clin Oncol* 2017; 35: LBA5003. [CrossRef]

---

Publisert: 21. august 2017. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.17.0579

Opphavsrett: © Tidsskriftet 2026 Lastet ned fra tidsskriftet.no 23. juni 2026.