
Granulocyttkolonistimulerende faktor ved nøytropeni sekundært til lymfoid beinmargsinfiltrasjon

ARTIKKEL

HAMMERSTRØM J

Sammendrag

Alvorlig nøytropeni sekundært til massiv lymfoid beinmargsinfiltrasjon ved lavgradig malign lymfoproliferativ sykdom medfører økt infeksjonsfare, spesielt etter beinmargshemmende cytostatikabehandling. Tre pasienter (to med kronisklymfatisk leukemi og en med follikulært lymfom) med massiv beinmargsinfiltrasjon og nøytropeni som ikke skyldtes cytostatikabehandling, ble behandlet med granulocyttkolonistimulerende faktor (G-CSF) for å se om nøytropenien kunnereverseres. Alle tre pasienter fikk konsentrasjonsstigning av nøytrofile granulocytter i perifert blod til normale eller høyere verdier under behandlingen. G-CSF gitt etter en påfølgende cytostatikabehandling hindret antakelig alvorlig cytostatikainduert nøytropeni hos en pasient. Ny behandling av en av pasientene med G-CSF i en senere, preterminal fase av sykdommen gav liten effekt på nøytrofile granulocyttd verdier. G-CSF ser ut til å kunne øke periferenøytrofile granulocyttd verdier selv hos pasienter med alvorlig nøytropeni som skyldes lymfoid beinmargsinfiltrasjon.

Publisert: 10. februar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.