
Mekoniumileus-ekvivalent hos voksne pasienter med cystisk fibrose

ARTIKKEL

HAANÆS OC

KONGERUD J

STORRØSTEN O-T

GEIRAN O

Sammendrag

Nær halvparten av 227 pasienter med cystisk fibrose i Norge er 18 år eller eldre (opplysning fra Sosialmedisinsk institutt for cystisk fibrose). Det er derfor viktig at forskjellige sykdomstilstander i denne pasientgruppen blir kjent for andre enn barnelege. Gastrointestinale komplikasjoner ved cystisk fibrose opptrer hyppigere jo eldre pasientene blir. Mekoniumileus-ekvivalent er en ileusliknende tilstand som skyldes ekstrem seig kittliknende feces i terminale ileum eller proksimale colon. Noen pasienter kan ha akutte episoder av forverring som fører til sykehusinnleggelse, men de aller fleste har plager av kronisk eller residiverende art med obstruksjonslignende smerter og/eller palpabel oppfylning i høyre fossa iliaca. Av 70 voksne pasienter med cystisk fibrose registrert ved Lungeseksjonen, Aker sykehus, over en åtteårsperiode, hadde 18 (26%) plager forenlig med mekoniumileus-ekvivalent. Behandlingen er først og fremst konservativ, og kirurgisk intervensjon bør unngås.

Publisert: 28. februar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 15. juli 2026.