

Gjentatt måling av ejeksjonsfraksjon etter akutt hjerteinfarkt

ARTIKKEL

HØGALMEN G

ERIKSSEN G

ROLLAG A

NERDRUM HJ

HARKET G

Sammenlikning av måling med nukleærmedisinsk teknikk 1. og 8. uke

Sammendrag

Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ble målt med nukleærmedisinsk teknikk hos 54 pasienter med akutt, trombolytiskbehandlet hjerteinfarkt 7. dag.

Ejeksjonsfraksjonsmålingene ble systematisk gjentatt åtte uker senere. Ejeksjonsfraksjonen hadde steget med ≥ 5 ejeksjonsfraksjonsenheter hos 17 pasienter (31%), hos 15 pasienter (28%) hadde den falt, mens hos 22 pasienter (41%) var den uendret.

Vi sammenliknet de tre gruppene med henblikk på flere variabler uten å finne vesentlige forskjeller. Hos pasientenemed stigning i ejeksjonsfraksjonen var det imidlertid signifikant lengre latenstid fra smertedebut til oppstart av trombolytisk behandling enn hos dem med fall.

Teoretisk kan stuning i myokard etter trombolys og remodellering forklare endringene i ejeksjonsfraksjonen over tid.

Gjentatt ejeksjonsfraksjonsmåling uker etter infarkt kan være nyttig for å fange opp pasienter med fallendeejeksjonsfraksjon i de tilfeller der revurdering av pågående behandling er særlig viktig.

Publisert: 10. juni 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 21. juli 2026.