

Benign symmetrisk lipomatose - Launois-Bensaudes syndrom

ARTIKKEL

SELVÅG E

SCHNEIDER M

WEREIDE K

KVEIM M

En kasuistikk

Sammendrag

Vi presenterer en 38-år gammel mann med en benign symmetrisk lipomatose av typen Launois-Bensaude. Fra sju års alder har han vært plaget av betydelig adipositas. Ved 30 års alder ble en hypogonadisme diagnostisert og behandlet. I løpet av årene utviklet han et Pickwick-syndrom med hypokapni og sekundær polycytemi. Som følge av dette utviklet det seg leggsår distalt på leggene og han gjennomgikk langvarig dermatologisk behandling ved Hudavdelingen, Ullevål sykehus. På grunn av en intertriginøs dermatitt i høyre lyske behandlet pasienten seg selv med kortikosteroidsalve tilsatt dekalon. Han utviklet først en liten ulcerasjon på behandlingsstedet, som senere utviklet seg til en utbredt fettvevsnekrose. Det ble nødvendig med radikal eksisjon og plastikkirurgisk behandling.

Publisert: 20. august 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.