
Hodgkins sykdom behandlet ved Regionsykehuset i Tromsø 1985-93

ARTIKKEL

NORUM J

WIST E

Sammendrag

I perioden 1985-93 ble 55 pasienter behandlet for Hodgkins sykdom ved Regionsykehuset i Tromsø.

Den gjennomsnittlige tiden fra første symptom til diagnose var fire måneder. Forsinkelsen var signifikant lengre for den lymfocyttrike undergruppen. Pasienter behandlet med LVPP-regimet (klorambucil, vinblastin, prokarbazin, prednisolon) hadde en betydelig økt risiko for helvetesild. Fem års overlevelse var 90%. Overlevelse av Hodgkins sykdom hadde lav forekomst av symptomer og høyt funksjonsnivå. Kvinner rapporterte en signifikant bedre total livskvalitet, mindre psykologisk påkjenning og mindre tretthet enn menn. Kostnaden for ett kvalitetsjustert leveår (QALY) ble beregnet til kroner 16510. Produksjonsgevinsten var inkludert og diskonteringsraten var satt til 10%. Dette resultatet gjør Hodgkins sykdom til en av de mest kostnadseffektive kreftsykdommer å behandle. Undersøkelsen viser også at sykdommen kan behandles desentralisert innenfor et multisentersamarbeidsprogram med godt resultat.

Publisert: 10. januar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.