

Nikotinavhengighet blant norske røykere og mulige konsekvenser for forebyggende tiltak

ARTIKKEL

KRAFT P

SVENDSEN T

HAUKNES A

Sammendrag

Denne undersøkelsen rapporterer data om nikotinavhengighet i form av Fagerströms test for nikotinavhengighet (FTND), blant norske dagligrøykere. Nikotinavhengigheten var høyere hos dem som røykte hjemmerullede sigaretter enn hos dem som røykte fabrikklagde sigaretter, til tross for at det gjennomsnittlige antall sigaretter røykt per dag var det samme idisse gruppene av røykere. Avhengigheten økte også med synkende debutalder for dagligrøyking. Nikotinavhengigheten var høyere blant dagligrøykere med lav utdanning sammenliknet med dem med høyere utdanning. Denne forskjellen kunne forklares ved forskjeller i andelene som røykte hjemmerullede sigaretter. Funnene diskuteres i lys av norske undersøkelser som har vist at hjemmerullede sigaretter kan inneholde to til tre ganger så mye nikotin og tjære som fabrikklagde sigaretter. Røykere av hjemmerullede sigaretter var mindre motivert for å slutte, noe som medfører at røykere av slike sigaretter utsettes for ekstra helsebelastninger sammenliknet med røykere av fabrikklagde sigaretter. Avgiften (og prisen) på en hjemmerullet sigarett er om lag det halve av prisen på en fabrikklaget sigarett. En økning av avgiften på rulletobakk vil være et effektivt helsefremmende tiltak, og vil redusere forskjeller i forekomst av sykdom og tidlig død mellom sosiale grupper.

Publisert: 30. januar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.