



# Poliomyelitt - ikke en utdødd sykdom

---

ARTIKKEL

REKAND T

AARLI JA

LANGELAND N

---

## Sammendrag

Den siste poliomyelittepidemi i Norge var i årene 1950-54. Artikkelen beskriver denne epidemien på Vestlandet på grunnlag av 243 journaler fra perioden 1950-54, registrert ved Haukeland Sykehus. På Vestlandet var sykdommen mest utbredt i 1952, mens det verste utbrudd på landsbasis var i 1951. I vårt materiale var det nesten lik kjønnsfordeling. De fleste innleggelser skjedde på sensommeren og høsten. 97% av pasientene hadde allmennsymptomer, det hyppigste var hodepine. Feberen var som regel moderat. Hos 56% av pasientene ble det registrert nakkestivhet. Det hyppigst neurologiske utfall var asymmetriske pareser i ekstremiteter. 7% av pasientene døde. Høy feber, utbredte pareser og respirasjonssvikt gav dårlig prognose. 57 pasienter hadde aparalytisk poliomyelitt og hadde kort opphold ved sykehuset.

Over 40 år senere, i perioden mellom 1991-95, var det 158 innleggelser (121 pasienter) i Nevrologisk avdeling på grunn av senfølger av poliomyelitt. De fleste av pasientene hadde hatt akutt poliomyelitt i tiden 1940-49 (57 tilfeller), mens det var 33 pasienter fra perioden 1950-59. Vi gjenkjente kun sju pasienter fra vår undersøkelse fra perioden 1950-54. Resultatene av undersøkelsen tyder på at behandling av senfølger av poliomyelitt etter epidemien i 1950-54 kan få økende betydning i årene som kommer.

---

Publisert: 10. februar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2022. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. august 2022.