

---

# Forskjeller i diagnosekriterier for akutt hjerteinfarkt ved norske sykehus

---

ARTIKKEL

FRETLAND S

KRÜGER Ø

---

## Sammendrag

I en tidligere undersøkelse fra Nord-Trøndelag, fant vi at de to sykehusene i dette fylket hadde ulike kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt. Denne spørreundersøkelsen er rettet til 69 medisinske avdelinger ved landets sykehushvorav 57 (83%) besvarte et spørreskjema om hvilke diagnostiske kriterier som er i bruk ved diagnosen akutt hjerteinfarkt. Seks sykehus angav ingen spesiell grense for varighet av brystmerter, ett angav 30-60 minutter, 14 sykehus oppgav 30 minutter, mens 36 oppgav kortere smertevarighet enn 30 minutter. Det var ingen store skiller mellom sykehusene vedrørende EKG-kriterier. Det var relativt stor forskjell mellom sykehusene i bruk av enzymer, enzymkombinasjoner og terskelverdier for positiv diagnose. Av de 46 sykehusene som brukte kreatinkinase, varierte grenseverdiene mellom 170 og 500 IE/l for menn og 150 og 400 IE/l for kvinner. For aspartatdehydrogenase varierte grensene mellom 40 og 100 IE/l for menn og 35 og 75 IE/l for kvinner. Ulike kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt kan ha konsekvenser for behandling, trygdemessig vurdering og for kartlegging av sykdomsforløpet.

---

Publisert: 28. februar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 7. juli 2026.