

---

# Etterundersøkelse av Souters albueproteser

---

ARTIKKEL

ANDREASSEN G

SOLHEIM LF

---

## Sammendrag

27 pasienter (30 albuer) med innsatt Souters albueprotese er etterundersøkt. 26 av pasientene hadde reumatoid artritt. Observasjonstiden var gjennomsnittlig fem år (2-10 år). Operasjonsindikasjonen var smerter og dårlig funksjon i albuen. Alle pasienter hadde betydelige preoperative røntgenologiske forandringer. Seks albuer er blitt reoperert med nyeprotoser. Årsaken til reoperasjonene var frakturer, løsning av protoser og luksasjoner. 19 albuer (63%) ble bedre etter primær operasjonen, åtte albuer (26%) var ikke blitt bedre. Tre pasienter kunne ikke svare på om de var blitt bedre eller dårligere. Fire av seks albuer som ble reoperert med innsetting av ny protese, ble verre enn før første operasjon. Røntgen ved etterundersøkelsen viste at 80% av humeruskomponentene hadde varierende grad av radiologisk løsning, og mer enn 50% hadde kranial migrasjon. Alle pasientene med peroperative frakturer er operert eller skal reopereres. Radiologisk løsning av humeruskomponenten gir usikkert langtidsresultat hos flertallet av pasientene. Reoperasjon med ny protese og peroperative frakturer ved proteseinnsetting gir dårlig resultat. Vi har tatt konsekvensen av resultatet og sluttet med denne protesen ved vårt sykehus.

---

Publisert: 10. mars 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeförening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 4. juni 2026.