
Klinisk diagnostikk av dyp venetrombose etter hofteprotesekirurgi

ARTIKKEL

ANDREASSEN G

DAHL OE

Sammendrag

Protesekirurgi i hofteleddet er forbundet med en høy frekvens av dyp venøs trombose. Som et ledd i en størreundersøkelse ble det utført en substudie hvor vi så på forekomsten av klinisk dyp venøs trombose den første uken etterhofteprotesekirurgi. Vi ønsket å få svar på om daglige rutinemessige samtaler og eventuelt kliniske undersøkelser avpasientene utført av visittgående leger, var god nok metode for å avsløre om pasienten hadde postoperativ dyp venøstrombose. Det var 258 pasienter som fullførte undersøkelsen. Tromboseprofylakse (dextran 70, lavmolekylært heparin(dalteparin) og knekorte elastiske strømper) ble gitt i løpet av den første postoperative uken. Bilateral venografi bleutført på dag 7 etter operasjonen og viste dyp venøs trombose hos 16% av pasientene. Visittgående leger påviste ikkekliniske tegn til dette hos noen av pasientene. Dyp venøs trombose den første uken etter hofteprotesekirurgi synes ikkeå være tilgjengelig for klinisk diagnostikk.

Undersøkelsen avdekket en høy forekomst av subklinisk dyp venøs trombose den første uken etter hofteprotesekirurgi, noe som kan forårsake fatal lungeemboli og posttrombotisk syndrom. Undersøkelsen bekrefter hvor viktig det erytterligere å forbedre tromboseprofylaksen etter hofteprotesekirurgi.

Publisert: 30. mai 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 21. juli 2026.