

Kirurgisk behandling av overvekt

ARTIKKEL

FANNELØP TO

AUNE S

WOXHOLT G

MICHELSEN JB

Sammendrag

Gastric wrapping ble utført for to pasientgrupper med sykkelig overvekt. 11 pasienter trengte revisjon pga. ikke-tolerable bivirkninger etter gastric banding. 14 ble operert primært med gastric wrapping. Det var få alvorlige komplikasjoner, men seks pasienter trengte reoperasjon. Ved kontroll gjennomsnittlig fire år etter gastric wrapping er gruppene sammenliknet. I gruppen som ble konvertert var gjennomsnittlig kroppsmasseindeks 41 ± 4 SD ved gastricbanding, 32 ± 8 SD ved gastric wrapping og 31 ± 9 SD ved kontroll. For gruppen med primæroperasjon var kroppsmasseindeks 40 ± 5 SD preoperativt, redusert til 32 ± 6 SD etter gastric wrapping. Røntgenkontroll viste enforkortning og forskyvning av mange av hylsene, uten sikker korrelasjon til vekttap. I vårt materiale gir gastricwrapping en tilfredsstillende opprettholdelse av vekttap ved nødvendig revisjon etter gastric banding. Hos de primæropererte er vektreduksjonen på linje med gastric banding. Gastric wrapping er imidlertid teknisk krevende, og vårmodifiserte metode omtales med referanse til originalbeskrivelsen og andre etablerte metoder.

Publisert: 10. juni 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeförening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.