

Kirurgisk behandling av karsinoid bronkialtumor

ARTIKKEL

DROGSET JO

HAAVERSTAD R

LEVANG OW

DALAKER M

BJERKESET T

Sammendrag

I perioden 1977-95 ble 20 pasienter, 12 menn og åtte kvinner, operert for karsinoid bronkialtumor ved Regionsykehuset i Trondheim og ved Innherred sykehus. Oppfølgingstiden var median 7,5 år (variasjon 0,5-18 år). Pasientene ble operert med lobektomi, kilereseksjon eller bronkoplastisk prosedyre. Ved oppfølgingstidspunktet var 19 av pasientene i live, og det ble ikke observert tumorresidiv hos noen. En pasient døde åtte år etter operasjonen på grunn av apoplexia cerebri. Ved symptomer fra luftveiene er karsinoid bronkialtumor en sjelden, men aktuell differensialdiagnose. Begrensedelungereseksjoner eller bronkoplastiske operasjoner var tilstrekkelig behandling der hvor tumor var lokalisert. Kirurgisk behandling av karsinoid bronkialtumor er effektivt, da man kan forvente varig helbredelse.

Publisert: 10. juni 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 4. juni 2026.