

Hjarteinfarkt hos unge pasientar

ARTIKKEL

VIK-MO H

MELBERG T

BARVIK S

Sammendrag

Verdien av koronar angiografi etter hjarteinfarkt hos uselekterte pasientar er omdiskutert. Denne studien omfattar 131 påfølgjande unge pasientar (< 50 år) som fekk utført koronar angiografi etter sitt første hjarteinfarkt.

Det var 71 pasientar som hadde angina pectoris (54%), 11 hadde stum iskemi (9%) og 49 pasientar (37%) hadde korkje angina pectoris eller myokardiskemi ved arbeids-EKG. Ved koronar angiografi vart det funne signifikant stenose i koronararterie hos 119 pasientar (91%). Pasientar med angina pectoris eller stum iskemi hadde oftare sjukdom i fleire koronararteriar (58% versus 25%, $p < 0,01$), sjukdom med høg angiografisk risiko (60% versus 33%, $p < 0,01$), og fleire trong revaskularisering (91% versus 57%, $p < 0,01$) enn dei andre. Likevel hadde ein stor del av pasientane utan symptom og funn ved arbeids-EKG alvorleg sjukdom og trong revaskularisering.

Hos unge pasientar som har hatt hjarteinfarkt, vil symptom og funn ved arbeids-EKG identifisere ei gruppe pasientar med meir alvorleg koronar hjartesjukdom, og der fleire pasientar treng revaskularisering enn dei andre pasientane. Menden diagnostiske presisjonen er liten, og utan koronar angiografi kan mange unge pasientar med høg risiko og trong til revaskularisering bli oversette.

Publisert: 20. juni 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeförening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 17. juni 2026.