Tidsskriftet Tidsskrift for Den norske legeforening

Urogenital tuberkulose

ARTIKKEL

ØDEGAARD T

GEITUNG JT

ØGREID P

Sammendrag

Urogenital tuberkulose utgjør en liten, men viktig gruppe av de 50-60 pasientene som får ekstrapulmonal tuberkulose iNorge hvert år. Innvandrere og flyktninger er en risikogruppe som allerede kan være smittet når de kommer tilNorge.

Symptomene er som regel generelle og de kliniske funn sparsomme ved tuberkulose i urogenitaltractus. Forkalkninger ide nedre urinveier og konkrementer i de øvre ledsager gjerne en tuberkuløs infeksjon. Pasienter med klinisk mistanke måundersøkes med urografi og røntgen thorax, urin til mikroskopi på syrefaste staver og dyrking på tuberkelbasiller.Cytologiske vevsprøver må vurderes dersom konvensjonell diagnostikk ikke fører frem. Diagnostikk, behandling ogetterkontroll fordrer et nært samarbeid mellom urolog, radiolog og infeksjonsmedisiner. Ved nøye oppfølging erprognosen god, idet 95% oppnår helbredelse.

Publisert: 10. november 1997. Tidsskr Nor Legeforen.
© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.