

Intraspinal blødning etter torakal epidural smertebehandling

ARTIKKEL

HETLAND S

BERG-JOHNSEN J

HEIER T

NAKSTAD PH

Sammendrag

I løpet av ett år ble tre pasienter operert for intraspinal blødning etter torakal epidural smertebehandling. Alle pasientene fikk sterke ryggsmarter og utviklet økende lammelser med sensibilitetstap. Symptomene utviklet seg etter innleggelse av epiduralkateter hos en pasient, mens de to andre fikk utfall etter at kateteret ble fjernet. Blødning med kompresjon av ryggmargen ble påvist med MT hos to av pasientene og ved myelografi hos en. Pasientene ble operert med avlastende laminektomi. Et epiduralt hematom ble evakuert hos to av pasientene, og begge gjenvant neurologisk funksjon, hvorav den ene fullstendig. Den tredje pasienten hadde subaraknoidalblødning og sannsynlig intramedullærblødning og forble paralytisk i beina. Ryggsmarter og progredierende lammelser i forbindelse med intraspinal prosedyrer må lede til umiddelbar utredning med MT eller myelografi og vurdering av neurokirurgisk intervensjon.

Publisert: 20. januar 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.