
Henvisning til Lipidklinikken - "riktige" pasienter med mangelfull anamnese

ARTIKKEL

SUNDT E

OSE L

TONSTAD S

Sammendrag

For å undersøke hvilke pasienter som henvises til Lipidklinikken ved Rikshospitalet ble 199 henvisninger i en periode i1995 gjennomgått retrospektivt og sammenliknet med opplysninger om de samme pasientene i Lipidklinikkens journaler. Avhenvisende leger var 78% allmennpraktiserende. Opplysninger om familiær hyperlipidemi, forekomst i familien av klinisk hjerte- og karsykdom og kostholdsvaner forekom i de fleste henvisningene. Henvisningene hadde ofte enten ingen diagnose eller upresis lipidrelatert diagnose. Røykevaner var omtalt i mindre enn halvparten av henvisningene. Opptil 80% av henvisningene manglet opplysninger om andre livsstilsforhold, som alkoholvaner og fysisk aktivitet. Disse opplysningene manglet også ofte i Lipidklinikkens journaler. Legene henviste pasienter med familiær risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, mens sigarett røyking, den viktigste eksterne risiko for å utvikle sykdom, tilsynelatende ikke var kartlagt hos mange pasienter på henvisningstidspunktet.

Publisert: 20. februar 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 21. juli 2026.