
Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

ARTIKKEL

SCHEI M

HESSEN JO

KILDAHL-ANDERSEN O

Sammendrag

Journalene til alle pasienter med utskrivningsdiagnosen akutt hjerteinfarkt ved Harstad sykehus i løpet av 1995, totalt 170, ble gjennomgått. 24% av pasientene fikk trombolytisk behandling. 15% av pasientene fikk ikke trombolytiskbehandling på tross av behandlingsindikasjon og fravær av kontraindikasjoner. Trombolytisk behandling ble igangsatt igjennomsnitt to timer og 18 minutter etter innleggelse og sju timer etter symptomdebut. 54% av pasientene haddeankommet sykehus innen seks timer etter symptomdebut og 73% innen 12 timer. Den sykehusinterne forsinkelsen førtrombolytisk behandling ble gitt, ansees for lang. Denne faktoren er tidligere i liten grad undersøkt ved norskesykehus.

På tross av relativt standardisert behandlingsopplegg er det i dag trolig forskjeller i bruk av trombolytiskbehandling mellom norske sykehus. Potensialet for å bedre den trombolytiske behandlingen er sannsynligvis betydelig. Resultatene har ført til omfattende omlegging av rutine ved Harstad sykehus.

Publisert: 20. februar 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.