
Dagkirurgisk tonsillektomi

ARTIKKEL

KRISTENSEN S

Sammendrag

Den hyppigste komplikation og væsentligste risiko ved tonsillektomi er primær efterblødning (blødning i første postoperative døgn). Med henblik på at afgøre om dagkirurgisk tonsillektomi indebærer øget risiko, blev hyppighed og tidsmæssig forekomst af operationskrævende primære efterblødninger identificeret retrospektivt i en serie på 1632 tonsillektomerede patienter. Tidsintervallerne mellem tonsillektomianaesthesiens afslutning og hæmostaseoperationsanaesthesiens indledning blev registeret i nedad afrundede hele timer. Tonsillektomierne var i 24 (1,5%) tilfælde kompliceret af hæmostaseoperationskrævende primære efterblødninger, hvoraf 79% optrådte inden otte timer postoperativt. Da mere end en femtedel af de alvorlige primære efterblødninger således opstår senere end otte timer postoperativt, er det ikke hensigtsmæssigt rutinemæssigt at foretage tonsillektomi i dagkirurgisk regi.

Publisert: 10. mars 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.