
Inflammatorisk tarmsykdom og graviditet

ARTIKKEL

HOVDENAK N

SCHLICHTING E

Sammendrag

Inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom) rammer ofte individer i reproduktiv alder. Behandlingen omfatter medikamenter med potensielle bivirkninger. Det er derfor rimelig at det oppstår bekymringer i forbindelse med svangerskap. Sykdommen påvirkes imidlertid lite av svangerskap. Residivfrekvensen er uendret, bortsett fra hospasienter med aktiv sykdom på konsepsjonstidspunktet. Residiv under svangerskapet behandles på vanlig måte. Akuttkirurgisk behandling foretas etter vanlige indikasjoner. Det er ingen økt forekomst av misdannelser eller komplikasjoner under svangerskap, ved fødselen eller post partum. Sectio caesarea kan bli nødvendig ved perianalsykdom. Medikamentell behandling bør, med få unntak, fortsettes uendret. Ingen uheldige bivirkninger er rapportert ved vanlig dosering av salazopyrin, 5-aminosalisylsyre eller steroider. Planlagte svangerskap bør startes i rolig fase av sykdommen.

Publisert: 20. mars 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.