
Hvor godt behandles pasienter med aterosklerotisk sykdom i allmennpraksis?

ARTIKKEL

SVILAAS A

WESTHEIM A

KRISTOFFERSEN JE

HJARTAAKERJ

THORESEN M

Sammendrag

Hos 1353 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom ble den sekundærprofylaktiskeintervensjon kartlagt i 1996-97 i 63 allmennpraksiser. 63% av pasientene var menn og 25% var røykere.

55% av pasientene fikk lipidsenkende medikasjon, overveiende med statin, mot 18% i en liknende kartlegging i 1994-95. Forskrivningen av lipidsenkende medisiner i Norge økte tilsvarende fra 1994 til 1996. Langt flere pasienter opp til fylte 75 år ble gitt lipidsenkende medisin enn personer over 75 år. 83% av pasientene hadde likevel et nivå av LDL-kolesterol over det anbefalte 2,6 mmol/l. Det var mangelfull antitrombotisk intervensjon og underbehandling med β -blokkere. Det systoliske blodtrykk hos hypertonikerne var ikke optimalt behandlet. Diabetespasienter ble behandlet på samme måte som ikke-diabetikere. I tilsvarende europeiske undersøkelser er andel pasienter med statinmedikasjon lavere og bruk av acetylsalisylsyre høyere.

Allmennpraktikerne har et spesielt ansvar for behandling og oppfølging skal behandlingsmålene nås og opprettholdes isekundærprevensjon ved aterosklerotisk sykdom.

Publisert: 10. juni 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. juli 2026.