

---

# Prehospital behandling av heroinforgiftning i Oslo i 1996

---

ARTIKKEL

STOKLAND O

HANSEN TB

NILSEN JE

---

## Sammendrag

Antall tilfeller av heroinoverdoseringer i Oslo er økende. I 1996 var de årsak til 12% (1248) av alle akutteutrykninger for ambulansetjenesten. Heroin kan gi fatal respirasjonssvikt, og i Oslo ble det rapportert i alt 104 dødepå grunn av heroin. Overdosering behandles på stedet av ambulanspersonell. Av 79 livløse som de fant, blesusciteringsforsøk startet hos 18 hvorav 11 med vellykket resultat. I alt måtte 846 misbrukere få motgift, naloxon, og blant dem var 678 (80%) komatøse. Bare 29 måtte innlegges i sykehus. Tidlig behandling forhindret sannsynligvis morbiditet og mortalitet ved at tidstapet med transport til sykehus ble unngått. Ambulansetjenesten behandler alle misbrukere med samme respekt som andre pasienter. Den har ikke politiskorte og har god kjennskap til og tillit til miljøet. Prehospital tjeneste sparer helsevesenet for ressurser og bør etter vår erfaring tilknyttes sykehus eller annen helseinstitusjon for gjensidig og optimal utnyttelse.

---

Publisert: 30. august 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.