
Lateks kontakturticaria og prikktesting med lateksekstrakt

ARTIKKEL

STEINKJER B

Sammendrag

Lateks kontakturticaria rapporteres med økende hyppighet. Atopikere med håndeksem har økt risiko for utvikling av type1-allergi overfor lateks.

Fra 1994 har vi prikktestet alle atopikere med håndeksem og samtidig inkludert lateksekstrakt i vår standardprikktestserie. Ved behov ble RAST - radioallergosorbenttest - mot lateks og hansketest utført.

Av 200 testede pasienter ble det påvist lateks kontakturticaria hos 24, hvorav 20 hadde positiv prikktest. Nipasienter fikk stilt diagnosen først etter at prikktest var utført. Hos seks pasienter skyldtes dette utilstrekkeliganamnese.

Kliniske manifestasjoner og funn hos 24 pasienter med lateks kontakturticaria presenteres. 17 personer var atopikere og 21 hadde håndeksem. Hyppigste aktuelle symptom var kløe, rødhet og urticaria ved bruk av gummihansker. Seks hadde hatt symptomer ved tannlegebehandling, tre ved gynekologisk undersøkelse og to rapporterte om anafylaktoide reaksjoner under narkose. 11 hadde yrkesrelaterte symptomer, åtte av disse var helsearbeidere.

Publisert: 10. september 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.