
Retningslinjer for avansert hjerte-lunge-redning av voksne pasienter

ARTIKKEL

THE EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer 16 eksperter fra ti forskjellige land en forkortet utgave av de nye retningslinjene for avansert hjerte-lunge-redning fra European Resuscitation Council. Det er få forandringer fra 1992-utgaven, og de er stort sett pedagogisk begrunnet. Det er ikke fremkommet ny overbevisende vitenskapelig kunnskap som skulle tilsi ytterligere forandringer. Mens det tidligere var atskilte algoritmer for ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi, asystole og elektromekanisk dissosiasjon, er de nå slått sammen til en. Ventilasjonsvolumet er halvert til 400-600 ml, og frekvensen for brystkompresjon økt til 100 min⁻¹. For andre rytmer enn ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi skal man nå ventilere og gjøre brystkompresjon i tre minutters perioder, mottidligere i ett minutt. Ett minutt gjelder fremdeles for ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi.

Publisert: 28. februar 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.