
Akutt hjerneslag - hvem dør i en slagenhet?

ARTIKKEL

SLØRDAHL SA

INDREDAVIKB

Sammendrag

Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i egne slagenheter har vist seg å redusere dødeligheten og bedrefunksjonsnivået hos den enkelte. Vi har sett nærmere på de 69 pasientene som døde blant de første 1000 pasientene som har vært innlagt og registrert med akutt hjerneslag i vår slagenhet. De som døde var eldre og dårligere ved innleggelsen enn de som overlevde, vurdert ut fra funksjon og neurologiske utfall. Progrediering av hjerneslaget de første to dagene var også mer uttalt i gruppen som døde. I gruppene som helhet kunne man ikke påvise forskjell i blodtrykk, hjerterefrekvens eller kroppstemperatur hos dem som døde i forhold til dem som overlevde, men det var økt diastolisk blodtrykk og hjerterefrekvens hos dem som døde med embolia cerebri og økt systolisk blodtrykk hos dem som døde med en primær intracerebral blødning.

Publisert: 20. april 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 21. juli 2026.