
Tensjonsfri vaginaltape - ny operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner

ARTIKKEL

SCHIØTZ HA

Sammendrag

En forenklet operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner er nylig utviklet i Sverige. Den oppfyller kriteriene for et minimalt invasivt inngrep og operasjonen gjøres vanligvis i lokalanestesi. Metoden går ut på å plassere et bånd av prolen som en slynge under urethra uten tensjon. Vår erfaring med de første 42 pasientene presenteres.

Alle de 42 kvinner som ble operert i 1996 og 1997, gjennomgikk subjektiv og objektiv evaluering i 1998. Preoperativt hadde alle stressinkontinens av betydelig grad. Oppfølgingstiden er 6-27 måneder, i gjennomsnitt 16 måneder.

Inngrepet ble godt tolerert. Alle unntatt fire av pasientene ble utskrevet innen 24 timer. Av komplikasjoner var det to blæreperforasjoner som tilhørte spontant, ett tilfelle av hudinfeksjon, og i ett tilfelle måtte vaginalsårretrevideres pga. manglende tilheling. Det var ingen dype infeksjoner eller avstøtingsreaksjoner, og ingen fikkurgeinkontinens. Subjektivt ble 85,4% av pasientene kurert og 9,8% ble nesten bra og brukte ikke lenger beskyttelse. Objektivt vurdert ble 80,5% kurert og 12,2% > 90% bedret.

Vår erfaring så langt er meget positiv. Inngrepet tolereres godt, har få komplikasjoner og selv om det ikke er gjortsammenliknende studier, synes resultatene å være på høyde med tradisjonelle metoder.

Publisert: 20. juni 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 21. juli 2026.