
Norske legers rutiner for opportunistisk screening for prostatakreft

ARTIKKEL

FOSSÅ SD

ERI LM AND THE NORWEGIANUROLOGIC CANCER GROUP (NUCG)

Sammendrag

Det er hevdet at PSA (prostata spesifikt antigen) -basert tidlig diagnose og behandling reduserer prostatakreftrelatert mortalitet. Studiens målsetting er å evaluere utbredelsen av PSA-basert screening i norsk primærhelsetjeneste.

I en spørreundersøkelse ble hyppigheten av PSA-testing av asymptotiske menn undersøkt blant norske allmennleger og bedriftsleger.

Legen initiert PSA-testing forekom hos 60% av legene (av og til 55%) med betydelige fylkesvise variasjoner, og uten klar øvre aldersgrense. En tredel av legene rapporterte økning av PSA-testing i året før undersøkelsen.

Legenes nåværende bruk av opportunistisk PSA-screening mangler vitenskapelig grunnlag. Slik testing bør først introduseres som helsetilbud når mortalitetsreduksjon er påvist som følge av PSA-screening og tidlig behandling.

Publisert: 10. oktober 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 15. juli 2026.