



Tidsskriftet

DEN NORSKE LEGEFORENING

Hudkomplikasjoner etter organtransplantasjon

ARTIKKEL

GJERSVIK PJ

Sammendrag

Organtransplanterte pasienter kan utvikle en rekke hudkomplikasjoner som følge av langvarig immunsuppressivmedikamentell behandling (prednisolon, azatioprin, ciklosporin). Komplikasjonene kan inndeles i effekter knyttet tilimmunsuppresjonen, slik som vanlige vorter, dermatofytose, premaligne lesjoner og hudkreft, og i preparatspesifikkeeffekter, slik som akne, rosacea og hypertrikose.

Organtransplanterte pasienter har en sterkt økt risiko for å utvikle hudkreft, spesielt plateepitelkarsinom, men også basalcellekarsinom, Kaposis sarkom og malignt melanom. Leger bør motivere og instruere organtransplantertepasientene til å unngå unødig soleksponering, som er en viktig risikofaktor for hudkreft, og til å bruke solfaktorkremog andre beskyttelsestiltak mot UV-stråling. Organtransplanterte pasienter med hudlesjoner som gir mistanke ommalignitet, bør henvises til spesialist i hudsykdommer, og pasienter med fastslått hudkreftdiagnose bør følges opp medregelmessige kontroller.

Publisert: 20. oktober 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2023. Lastet ned fra tidsskriftet.no 30. november 2023.