

NYTT OM LEGEMIDLER

Lavere pris åpner for stønad til PCSK9-hemmere for flere

Staten har inngått en refusjonsavtale med produsentene som gir lavere priser for PCSK9-hemmere. Prisene er ikke offentlige. Legemidlene er dermed vurdert som kostnads-effektive for en noe større pasientgruppe enn tidligere, slik at flere pasienter med hyperkolesterolemi kan få individuell stønad på blå resept (1).

Det kan gis stønad til pasienter som har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol) med:

- familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og som har LDL-kolesterol 5 mmol/L eller høyere under pågående behandling
- hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-kolesterol 4 mmol/L eller høyere under pågående behandling
- hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferebehandling

Avtalen gjelder ikke pasienter med hvit resept. Utgifter refunderes ikke gjennom bidragsordningen.

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i indremedisin, barnesykdommer, eller lege fra tilsvarende sykehusavdelinger som kan søke.

Søknaden må inneholde informasjon om:

- hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt og høyeste dose som er brukt
- oppnådd LDL-kolesterolverdi med pågående behandling
- redegjørelse for hvorfor forhåndsgodkjent behandling ikke kan / ikke lenger kan benyttes
- kontraindikasjoner mot annen forhåndsgodkjent behandling

Nye retningslinjer gjelder fra 1. mai 2017. Søknader som ikke er ferdigbehandlet hos Helfo vil bli behandlet etter de nye retningslinjene, selv om søknaden er mottatt før 1. mai. Pasienter som tidligere har fått avslag kan, etter ny søknad fra spesialist, få innvilget stønad dersom vilkårene er oppfylt.

Eplerenon mot hjertesvikt – enklere vilkår for blå resept

Eplerenon er en aldosteronantagonist som brukes i behandlingen av hjertesvikt. På grunn av generisk konkurranse har prisen falt betydelig. De spesifikke vilkårene for blå resept er derfor fjernet fra 15. mai. Det er ikke lenger krav om resept fra sykehus. Refusjon er heller ikke lenger begrenset til inntil seks måneder behandling.

Eplerenon kan forskrives på blå resept av alle leger, se indikasjon:

- Som tillegg til standardbehandling, inkl. betablokkere, for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med stabil venstre ventrikkel dysfunksjon (LVEF \leq 40%) og klinisk påvist hjertesvikt etter nylig gjennomgått hjerteinfarkt.
- Som tillegg til standard optimal behandling for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos voksne pasienter med New York Heart Association (NYHA)-klasse II (kronisk) hjertesvikt og venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon (LVEF \leq 30%).

Aldosteronantagonister (spironolakton, eplerenon) er en viktig del av standard hjertesviktbehandling (2). Alle pasienter med symptomatisk hjertesvikt (NYHA-klasse II-IV) skal ha behandling med ACE-hemmer og betablokker. Dersom pasienten fremdeles har symptomer og ejsjonsfraksjon (EF) $<$ 35%, anbefales det å legge til en aldosteronantagonist (2). Disse legemidlene reduserer både symptomer og dødelighet ved hjertesvikt. De gir imidlertid økt risiko for hyperkalemi og nyresvikt. Det er derfor viktig med nøye oppfølging.

Referanser:

1. <https://helfo.no/viktige-meldinger/nye-retningslinjer-for-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere> (09.05.2017) 2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 37: 2129-200.



Triptaner mot migrene – enklere vilkår for blå resept

De spesifikke vilkårene for blå resept er fjernet for alle triptaner fra 15. mai. Det er ikke lenger krav om at sumatriptan tabletter må prøves først.

På grunn av generisk konkurranse og trinnpris er prisen på alle de mest brukte triptanene redusert. I tillegg til sumatriptan, har også zolmitriptan, rizatriptan og eletriptan fått trinnpris.

Almotriptan (Almogran), naratriptan (Naramig) og frovatriptan (Migard) har ikke trinnpris. Disse er lite brukt, og siden prisen er vesentlig høyere, bør de fortsatt kun brukes i spesielle tilfeller.

Kloksacillin ikke lenger tilgjengelig

Kloksacillin brukes mot infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker. Etter eget ønske sluttet produsenten «Meda» å markedsføre Ekvacillin (kloksacillin) 500 mg tabletter fra 1 mai 2017.

Råd til leger:

- Dikloksacillin kan erstatte kloksacillin med samme dosering til voksne pasienter. Bør bare brukes dersom det er helt nødvendig.
- Heracillin (flukloksacillin) 50 mg/ml mikstur kan være et alternativ til små barn som trenger behandling med et betalaktamaseresistent penicillin. Dette er et uregistrert legemiddel og må forskrives på godkjenningfritak.

Leger bør eventuelt rådføre seg med indremedisiner eller infeksjonsmedisiner.