

NYTT OM LEGEMIDLER

Sesonginflensavaksiner 2018/2019

Sesongens influensavaksiner er tilgjengelige. I Norge selges Influvac, Vaxigrip, Vaxigriptetra og Fluenz Tetra. Årets vaksiner inneholder to nye virusstammer.

Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2018/2019:

- En A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme
- En A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-lignende virusstamme (ny)
- En B/Colorado/06/2017-lignende virusstamme (ny)

Vaxigriptetra og Fluenz Tetra inneholder i tillegg influensa B-virusstammen B/Phuket/3073/2013, som også var i fjorårets vaksiner.

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:

Vaksine	Type *	Aldersgruppe	Administrasjonsmåte
Influvac «Mylan Healthcare B.V.»	Inaktivert, over- flateantigen	Fra seks måneder	intramuskulært
Vaxigrip «Sanofi Pasteur Europe»	Inaktivert, splitt- virus	Fra seks måneder	intramuskulært
Vaxigriptetra «Sanofi Pasteur Europe»	Inaktivert, splitt- virus	Fra seks måneder	intramuskulært
Fluenz Tetra «AstraZeneca AB»	Levende, svekket	Fra to til 18 år	Nasalt

* Alle vaksiner er produsert i egg.

Vaksinene er ikke tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt tiomersal som konserveringsmiddel.

Med mindre det er sterke grunner til at pasienten skal ha en bestemt vaksine, bør legen forskrive generisk.

Sesonginflensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:

- Alle fra og med fylte 65 år.
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggstrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
- Barn og voksne med sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og husstandskontakter til immunosupprimerte pasienter. Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet: fhi.no/influensa

Dosering til barn

Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør ha to doser med minst fire ukers intervall. Barn under tre år kan få en halv dose på 0,25 ml, men 0,5 ml kan også brukes.

Vaksine som nesespray

Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor. Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert informasjon.



Ertugliflozin har fått refusjon

SGLT2-hemmeren ertugliflozin har fått forhåndsgodkjent refusjon alene og i kombinasjon med andre antidiabetika.

Refusjonskoder:

ICPC: T90, ICD: E11, type 2 diabetes mellitus

Ertugliflozin (Steglaro)

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Vilkår 232:

Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Sitagliptin og ertugliflozin (Steglujan)

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler i tråd med godkjent preparatomtale.

Vilkår 232, se over.

Metformin og ertugliflozin (Segluromet)

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Vilkår 233:

Refusjon ytes til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.