informert om nye gjennombrudd. Gjennom databasen MedNytt.no formidler vi tidlige vurderinger av nye metoder fra våre internasjonale samarbeidspartnere.

Inger Norderhaug
Marianne Klemp Gjertsen
Berit Mørland

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Litteratur

1. Bach-Gansmo T, Bogsrud TV. Vurdering av ny medisinsk teknologi. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 646.
2. Slik oppsummerer vi forskning. Håndbok for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2006.
3. Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB et al. The development of QUADAS: a tool for the quality assessment of studies of diagnostic accuracy included in systematic reviews. BMC Med Res Methodol 2003; 3: 25–38

T. Bach-Gansmo
& T. Bogsrud svarer:

Vi ønsket med vårt innlegg å skape debatt og bidra til at fremtidig medisinsk teknologi ikke blir gjenstand for dokumentasjonskrav som forsinker innføringen, slik det skjedde med PET. Vi er helt enige i at det må foreligge god dokumentasjon og at det må stilles strenge krav før ny teknologi innføres.

Makten i en rapport fra Kunnskapssenteret er stor. Urealistiske krav, som vi mener det ble stilt for PET, gagnar verken forskning eller klinisk virksomhet. Selv om man ved Kunnskapssenteret hevder at deres rolle i prosessen ikke er å gi anbefalinger, men utelukkende å fremlegge kunnskapsgrunnlaget, kan politikerne oppfatte det annerledes. Etter at vi hadde påpekt at Norge var et av ytterst få land i Europa uten PET-skanner, fikk undertegnede brev fra daværende helseminister Høybråten, som var helt klar på at man allikevel måtte vente med å introdusere PET i Norge. Begrunnelsen var at teknologien ifølge rapporten fra Kunnskapssenteret kun var eksperimentell metodikk.

Vi er helt enige i at veien videre bør gå gjennom nasjonale retningslinjer. Vårt syn er imidlertid at litteraturen som legges til grunn, ikke utelukkende må være rando-

miserte, blindede studier med påvist overlevelse og sparte kostnader som hovedvariabler. Slike studier er først og fremst utviklet for evaluering av forskjellige behandlinger, de er mindre egnet for evaluering av medisinsk teknologi (1). Ny teknologi evalueres best ved sammenlikning med eksisterende metodikk, men når den nye gir høy tilleggsgevinst, blir det få randomiserte studier. Ved fremtidig evaluering av ny medisinsk teknologi må det kunne legges vekt også på slike sammenliknende studier.

For oss som diagnostikere er beviselig bedret diagnostikk et viktig delmål. Vi utøver vårt fag for å gi klinikerne best mulig kort på hånden for å kunne gi optimal behandling – det er derfor det utføres bilde-diagnostikk. Når det ved neste korsvei kan dokumenteres at en teknologisk nyvinning definerer en sykdomstilstand bedre enn tidligere, må eventuelle kostnader og bivirkninger utredes. Først når riktigere behandling er valgt på bakgrunn av bedret diagnostikk, vil man kunne måle økt overlevelse og sparte kostnader. Skjønt – økte kostnader for bedret diagnostikk kan være et korrekt valg. Vi leser av deres innlegg at vi langt på vei er enige.

Tore Bach-Gansmo
 Haukeland universitetssykehus

Trond Bogsrud
 Oslo universitetssykehus

Litteratur

1. Høigaard L. Are health technology assessments a reliable tool in the analysis of the clinical value of PET in oncology? Who audits the auditors? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2003; 30: 637–41.

Tidsskriftet praktiserer tilsvaretsrett i henhold til Vancouver-gruppens regler (<http://www.icmje.org/#correspond>). Dersom vitenskapelige artikler kommenteres i spalten, får artikkelforfatterne mulighet til å svare i samme nummer. Slik automatisk tilsvaretsrett gjelder kun for forfattere av vitenskapelige artikler. Den gjelder imidlertid ikke dersom debatten fortsetter i spalten Brev til redaktøren, dvs. hvis det for eksempel publiseres et motinnlegg til det første tilsvaret.